

Zweiter Teil

Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen

(Heilmittelkatalog)

**Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen
nach § 92 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 SGB V**

I. A Maßnahmen der Physikalischen Therapie

Inhaltsverzeichnis

- **Maßnahmen der Physikalischen Therapie**
Verzeichnis verordnungsfähiger Heilmittel und gebräuchlicher Abkürzungen im Heilmittelkatalog

- **Indikationskatalog Maßnahmen der Physikalischen Therapie**
 1. Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane
 2. Erkrankungen des Nervensystems
 3. Erkrankungen der inneren Organe
 4. Sonstige Erkrankungen

Maßnahmen der Physikalischen Therapie

Verzeichnis der gebräuchlichen Abkürzungen im Heilmittelkatalog

| | | | |
|---------------|---|------|---------------------|
| BGM | = Bindegewebsmassage | | |
| CM | = Colonmassage | | |
| KG | = allgemeine Krankengymnastik | | |
| KG-Gerät | = Gerätegestützte Krankengymnastik mit Sequenztrainingsgeräten und/oder Hebel- und Seilzugapparaten | | |
| KG-Muko | = Krankengymnastik (Atemtherapie) zur Behandlung der Mukoviszidose | | |
| KG-ZNS | = spezielle Krankengymnastik zur Behandlung von Erkrankungen des ZNS bzw. des Rückenmarks nach Vollendung des 18. Lebensjahrs unter Einsatz der neurophysiologischen Techniken nach Bobath, Vojta oder PNF (Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation) | | |
| KG-ZNS-Kinder | = spezielle Krankengymnastik zur Behandlung von Erkrankungen des ZNS bzw. des Rückenmarks längstens bis Vollendung des 18. Lebensjahrs unter Einsatz der neurophysiologischen Techniken nach Bobath oder Vojta. | | |
| KMT | = Klassische Massagetherapie | | |
| MLD-30 | = Manuelle Lymphdrainage (einschl. Kompressionsbandagierung), Therapiedauer 30 Min. an der Patientin oder dem Patienten (Teilbehandlung) | | |
| MLD-45 | = Manuelle Lymphdrainage (einschl. Kompressionsbandagierung), Therapiedauer 45 Min. an der Patientin oder dem Patienten (Großbehandlung) | | |
| MLD-60 | = Manuelle Lymphdrainage (einschl. Kompressionsbandagierung), Therapiedauer 60 Min. an der Patientin oder dem Patienten (Ganzbehandlung) | | |
| MT | = Manuelle Therapie | | |
| PM | = Periostmassage | | |
| SM | = Segmentmassage | | |
| UWM | = Unterwasserdruckstrahlmassage | | |
| Erst-VO | = Erstverordnung | / VO | = pro Verordnung |
| Folge-VO | = Folgeverordnung | + | = und (zusätzlich) |
| | | / | = oder (alternativ) |

1 Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|--|--|--|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| WS1 Wirbelsäulenerkrankungen <ul style="list-style-type: none"> • mit prognostisch kurzzeitigem Behandlungsbedarf z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Discopathien - Myotendopathien - Blockierungen - Osteochondrosen - Spondyl- oder Uncovertebralarthrosen - reflektorische Störungen - Osteoporose - Skoliosen/Kyphosen - behandlungsbedürftige Haltungsstörungen (obligat positiver Mathiaß-Test) - statische Störungen | a Funktionsstörungen/Schmerzen durch Gelenkfunktionsstörung, Gelenkblockierung (auch ISG oder Kopfgelenke) | Funktionsverbesserung, Schmerzreduktion durch Verringern o. Beseitigen der Gelenkfunktionsstörung | A. KG/MT <i>C. Traktion/Wärme-/Kältetherapie</i> | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6 Einheiten Frequenzempfehlung: mind. 2x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes |
| | b Funktionsstörungen/Schmerzen durch Fehl- oder Überbelastung discoligamentärer Strukturen | Funktionsverbesserung, Verringerung, Beseitigung der Fehl- oder Überbelastung discoligamentärer Strukturen | A. KG <i>C. Traktion</i> | |
| | c Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzung | Wiederherstellung, Besserung der gestörten Muskelfunktion | A. KG/KG-Gerät B. Übungsbehandlung / Chirogymnastik | |
| | d segmentale Bewegungsstörungen | Wiederherstellung, Besserung der gestörten Beweglichkeit | A. KG/MT B. Übungsbehandlung/ Chirogymnastik <i>C. Wärmetherapie/Kältetherapie</i> | |
| | e Schmerzen/Funktionsstörungen durch Muskelspannungsstörungen; Verkürzung elastischer und kontraktile Strukturen, Gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungen | Regulierung der schmerzhaften Muskelspannung, der Durchblutung, des Stoffwechsels, Beseitigung der Gewebequellungen, -verhärtungen und -verklebungen | A. KMT B. UWM/SM/PM/BGM <i>C. Elektrotherapie/ Wärmetherapie/Kältetherapie/ hydroelektrische Bäder</i> | |

1 Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|---|--|---|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittelkombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| WS2 Wirbelsäulenerkrankungen <ul style="list-style-type: none"> • mit prognostisch längerdauerndem Behandlungsbedarf (insbesondere Einschränkungen von relevanten Aktivitäten des täglichen Lebens, multistrukturale oder funktionelle Schädigung) z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Bandscheibenprolaps insbesondere mit radiculären Syndromen - Spondylolisthesis - Foramenstenosen - Korsettversorgte Skoliosen/ Kyphosen - Floride juvenile Hyperkyphosen - Seronegative Spondylarthritis/ M. Bechterew - Entzündlich-rheumatische WS-Erkrankungen | a Funktionsstörungen/Schmerzen durch Gelenkfunktionsstörung, Gelenkblockierung (auch ISG oder Kopfgelenke) | Funktionsverbesserung, Schmerzreduktion durch Verringern o. Beseitigen der Gelenkfunktionsstörung | A. KG/MT C. <i>Traktion/Wärmetherapie/ Kältetherapie</i> | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO |
| | b Funktionsstörungen/Schmerzen durch Fehl- oder Überbelastung discoligamentärer Strukturen | Funktionsverbesserung, Verringerung, Beseitigung der Fehl- oder Überbelastung discoligamentärer Strukturen | A. KG C. <i>Traktion</i> | Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 18 Einheiten davon für Massage-techniken bis zu 10 Einheiten davon für standardisierte Heilmittelkombination bis zu 10 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich |
| | c Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzung | Wiederherstellung, Besserung der gestörten Muskelfunktion | A. KG/KG-Gerät B. Übungsbehandlung/ Chirogymnastik | |
| | d segmentale Bewegungsstörungen | Wiederherstellung, Besserung der gestörten Beweglichkeit | A. KG/MT B. Übungsbehandlung/ Chirogymnastik C. <i>Wärmetherapie/Kältetherapie</i> | |
| | e motorische Parese von Extremitätenmuskeln/sensomotorische Defizite | Erhalt der kontraktiven Strukturen, Verbesserung der Kraft der paretischen Muskulatur bei prognostisch reversibler Denervierung | A. KG/KG-Gerät B. Übungsbehandlung C. <i>Elektrostimulation</i> | |
| | f Schmerzen / Funktionsstörungen durch Muskelspannungsstörungen; Verkürzung elastischer und kontraktiver Strukturen, Gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungen | Regulierung der schmerzhaften Muskelspannung, der Durchblutung, des Stoffwechsels, Beseitigung der Gewebequellungen, -verhärtungen und -verklebungen | A. KMT B. UWM/SM/PM/BGM C. <i>Elektrotherapie/Wärmetherapie/ Kältetherapie/hydroelektrische Bäder</i> | |
| | | | Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes Hinweise: Sofern im Einzelfall verlaufsabhängig unmittelbar ein Wechsel von WS1 zu WS2 medizinisch begründet ist, ist die bereits zu WS1 erfolgte Verordnungsmenge auf die Gesamt- | |

1 Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| | g D1 komplexe Schädigungen / Funktionsstörungen - bei zwei führenden Schädigungen/Funktionsstö- rungen a bis d neben f | siehe a bis f | D1. KG + KG-Gerät + MT + KMT + Wärme-/Kältetherapie + Elektrotherapie zusätzlich: - ggf. hydroelektrische Bäder - ggf. Elektrostimulation - ggf. Traktion - ggf. Peloid-Vollbäder | verordnungsmenge von WS2 anzurechnen. Ein Wechsel von WS2 zu WS1 ist <u>nicht</u> möglich. |

1 Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|---|--|--|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| EX1 Verletzungen/Operationen und Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens <ul style="list-style-type: none"> • mit prognostisch kurzzeitigem Behandlungsbedarf z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Distorsionen, Kontusionen - Arthrosen - entzündlich-rheumatische Gelenkerkrankung (ohne akut entzündlichen Schub) - Periarthropathien - Bursitis - Fußfehlhaltungen (wie nicht fixierte Klump-, Spitz- und Sichelfußhaltungen) | a Gelenkfunktionsstörungen, Bewegungsstörungen, Kontrakturen | Wiederherstellung, Besserung der gestörten Beweglichkeit | A. KG/MT B. Übungsbehandlung C. <i>Wärmetherapie/Kältetherapie/Elektrotherapie</i> | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes, Gelenkschulung |
| | b Funktionsstörungen durch Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzung | Wiederherstellung, Besserung der gestörten Muskelfunktion | A. KG/KG-Gerät B. Übungsbehandlung | |
| | c Schmerzen/Funktionsstörungen durch Muskelspannungsstörungen; Verkürzung elastischer und kontraktiler Strukturen, Gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungen | Regulierung der schmerzhaften Muskelspannung, der Durchblutung, des Stoffwechsels, Beseitigung der Gewebequellungen, -verhärtungen und -verklebungen | A. KMT B. UWM/SM/PM/BGM C. <i>Elektrotherapie/Wärmetherapie/Kältetherapie/hydroelektrische Bäder</i> | |

1 Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|---|--|--|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittelkombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| EX2 Verletzungen/Operationen und Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens <ul style="list-style-type: none"> • mit prognostisch mittelfristigem Behandlungsbedarf (insbesondere Einschränkungen von relevanten Aktivitäten des täglichen Lebens, multi-strukturelle funktionelle Schädigungen) z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Frakturen - Sehnenrupturen - Kreuzbandersatz, Arthrodesen, Materialentfernung nach Osteosynthesen - Erkrankungen mit Gefäß-, Muskel- und/oder Bindegewebsbeteiligung, insbesondere entzündlich-rheumatische Gelenkerkrankung mit akut entzündlichem Schub und systemische Erkrankungen - Sympathische Reflexdystrophie - Stadium I bis II | a Gelenkfunktionsstörungen, Bewegungsstörungen, Kontrakturen | Wiederherstellung, Besserung der gestörten Beweglichkeit | A. KG/MT B. Übungsbehandlung C. Wärme-/Kältetherapie/ Elektrotherapie | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • 18 Einheiten davon für Massage-techniken insgesamt bis zu 10 Einheiten davon für standardisierte Heilmittelkombinationen bis zu 10 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes Hinweise: Sofern im Einzelfall verlaufsabhängig unmittelbar ein Wechsel von EX1 zu EX2 medizinisch begründet ist, ist die bereits zu EX1 erfolgte Verordnungsmenge auf die Gesamtverordnungsmenge von EX2 anzurechnen. Ein Wechsel von EX2 zu EX1 ist <u>nicht</u> möglich. Störungen des Lymphabflusses siehe LY1 Trophische Störungen siehe SO4 |
| | b Funktionsstörungen durch Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzung | Wiederherstellung, Besserung der gestörten Muskelfunktion | A. KG/KG-Gerät B. Übungsbehandlung | |
| | c Schmerzen/Funktionsstörungen durch Muskelspannungsstörungen; Verkürzung elastischer und kontraktiler Strukturen, Gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungen | Regulierung der schmerzhaften Muskelspannung, der Durchblutung, des Stoffwechsels, Beseitigung der Gewebequellungen, -verhärtungen und -verklebungen | A. KMT B. UWM/SM/PM/BGM C. Elektrotherapie/Wärmetherapie/ Kältetherapie/hydroelektrische Bäder | |
| | d D1 komplexe Schädigungen / Funktionsstörungen - bei zwei führenden Schädigungen / Funktionsstörungen a und b neben c | siehe a bis c | D1 KG + KG-Gerät + MT + KMT + Wärme-/Kältetherapie + Elektrotherapie zusätzlich: - ggf. hydroelektrische Bäder | |

1 Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|---|--|---|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittelkombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| EX3 Verletzungen/Operationen und Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens <ul style="list-style-type: none"> • mit prognostisch längerem Behandlungsbedarf (insbesondere Einschränkungen von relevanten Aktivitäten des täglichen Lebens, multistrukturale funktionelle Schädigungen) z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Beckenfrakturen, Gelenk-/gelenksnahe Frakturen, Stück-/Trümmerfrakturen - komplexe Sehnen-, Band-, Gelenkschäden - Osteotomien großer Röhrenknochen, Endoprothesen, Girdlestone Hüfte, Amputationen, Ex-artikulationen - Erkrankungen mit Gefäß-, Muskel- und/oder Bindegewebsbeteiligung, insbesondere entzündlich-rheumatische Gelenkerkrankung mit akut entzündlichen Schub und systemische Erkrankungen - Sympathische Reflexdystrophie Stadium III | a Gelenkfunktionsstörungen, Bewegungsstörungen, Kontrakturen | Wiederherstellung, Besserung der gestörten Beweglichkeit | A. KG/MT B. Übungsbehandlung C. <i>Wärme-/Kältetherapie/ Elektrotherapie</i> | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • 30 Einheiten davon für Massage-techniken insgesamt bis zu 10 Einheiten davon für standardisierte Heilmittelkombinationen bis zu 10 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes Hinweise: Sofern im Einzelfall verlaufsabhängig unmittelbar ein Wechsel von EX1 bzw. EX2 zu EX3 medizinisch begründet ist, ist die bereits zu EX1 bzw. EX2 erfolgte Verordnungsmenge auf die Gesamtverordnungsmenge von EX3 anzurechnen. Ein Wechsel von EX3 zu EX1 oder EX2 ist <u>nicht</u> möglich. Störungen des Lymphabflusses siehe LY1 Trophische Störungen siehe SO4 |
| | b Funktionsstörungen durch Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzung | Wiederherstellung, Besserung der gestörten Muskelfunktion | A. KG/KG-Gerät B. Übungsbehandlung | |
| | c Schmerzen/Funktionsstörungen durch Muskelspannungsstörungen; Verkürzung elastischer und kontraktiler Strukturen, Gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungen | Regulierung der schmerzhaften Muskelspannung, der Durchblutung, des Stoffwechsels, Beseitigung der Gewebequellungen, -verhärtungen und -verklebungen | A. KMT B. UWM/SM/PM/BGM C. <i>Elektrotherapie/Wärmetherapie/ Kältetherapie/hydroelektrische Bäder</i> | |
| | d D1 komplexe Schädigungen / Funktionsstörungen <ul style="list-style-type: none"> - bei zwei führenden Schädigungen / Funktionsstörungen a und b neben c | siehe a bis c | D1 KG + KG-Gerät + MT <ul style="list-style-type: none"> + KMT + Wärme-/Kältetherapie + Elektrotherapie zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> - ggf. hydroelektrische Bäder | |

1 Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|--|--|--|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>EX4 Miss- und Fehlbildungen, Strukturschäden der Stütz- und Bewegungsorgane im Säuglings-, Kleinkind- und Kindesalter</p> <p>z. B. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - fixierter Klump-, Spitz- und Sichelfuß - Dysmelie - Muskulärer Schiefhals - Hüftgelenkluxation - Fehlbildungsskoliosen - Arthrogryposis multiplex congenita | <p>a Funktionsstörungen durch Muskelverkürzungen, Sehnenverkürzungen, Kontrakturen, Muskelinsuffizienz, -dysbalance, -verkürzung, segmentale Bewegungsstörungen</p> | <p>Wiederherstellung, Besserung der Beweglichkeit der betroffenen und benachbarten Gelenke, der Muskel-, Sehnen- und Gewebedehnbarkeit</p> | <p>A. KG/MT</p> <p><i>C. Wärme-/Kältetherapie</i></p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 50 Einheiten <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich <p>Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes und Anleitung der Bezugsperson</p> <p>Hinweis: Störungen der Atmung, des Darmes und der Ausscheidung siehe ATM oder SON</p> |

1 Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|--|---|---|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| CS chronifiziertes Schmerz- syndrom z. B. bei - Phantomschmerzen nach Amputationen - Neuralgie, Kausalgie - neuropathischen Schmerzen - Chronisches regionales Schmerzsyndrom - Fibromyalgie | a unspezifische schmerzhaft Bewegungsstörungen, Funktionsstörungen, auch bei allgemeiner Dekonditionierung | Besserung der Beweglichkeit, Entlastung schmerzender Strukturen, Verbesserung von Ausdauer, Beweglichkeit oder Stabilität; physikalische Therapie mit aktivierendem Ansatz | A. KG/KG-Gerät B. Übungsbehandlung | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 18 Einheiten <p style="text-align: center;">davon für Massage- techniken</p> <p style="text-align: center;">bis zu 10 Einheiten</p> Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungs- programms und von Schmerz- bewältigungsstrategien |
| | b Schmerzen/Funktions-störungen durch Muskelverspannungs- störungen; Verkürzung elastischer und kontraktiler Strukturen, Gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungen | Regulierung der schmerzhaften Muskelspannung, der Durch- blutung, des Stoffwechsels, Be- seitigung der Gewebequellungen, -verhärtungen und -verklebungen; physikalische Therapie mit entspannend sedierendem Ansatz | A. KTM B. UWM/SM/PM/BGM C. <i>Elektrotherapie/Wärmetherapie/ Kältetherapie/hydro-elektrische Bäder</i> | |

2 Erkrankungen des Nervensystems

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|--|---|--|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| ZN1 ZNS-Erkrankungen einschließlich des Rückenmarks <ul style="list-style-type: none"> • längstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs z. B. <ul style="list-style-type: none"> - prä-, peri-, postnatale Schädigungen (z. B. Meningomyelocele, infantile Cerebralparese, Spina bifida) - zerebrale Blutung, Tumor, Hypoxie - Schädelhirn- und Rückenmarkverletzungen - Meningoencephalitis, Poliomyelitis - Querschnittssyndrome - Vorderhornerkrankungen des Rückenmarks - Muskeldystrophie | a Bewegungsstörungen von Extremitäten, Rumpf- und Kopfmuskulatur z. B. mit Hemi-, Tetra-, Paraplegie/-parese | Förderung und Besserung der Motorik und Sensomotorik | A. KG-ZNS-Kinder/KG <i>C. Wärmetherapie/Kältetherapie</i> | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO |
| | b Funktionsstörungen durch Muskeltonusstörungen, z. B. Spastik, auch mit Folgeerscheinungen wie Kontrakturen, zentral bedingte Muskelhypotonie | Regulierung des Muskeltonus, Vermeidung von Kontrakturen | A. KG-ZNS-Kinder/KG <i>C. Wärmetherapie/Kältetherapie</i> | Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 50 Einheiten |
| | c zentrale Koordinationsstörungen und Störungen der Grob- und Feinmotorik wie z. B. Dystonie, choreatisch-athetotische Störungen, ataktische Störungen | Förderung und Besserung der Koordination und der Grob- und Feinmotorik, Sicherung der Mobilität | A. KG-ZNS-Kinder/KG <i>C. Wärmetherapie/Kältetherapie</i> | Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich Hinweise: Störungen der Atmung, des Darmes und der Ausscheidung siehe AT oder SO Störungen des Lymphabflusses siehe LY1 Trophische Störungen siehe SO4 |

2 Erkrankungen des Nervensystems

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|--|---|--|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| ZN2 ZNS-Erkrankungen einschließlich des Rückenmarks <ul style="list-style-type: none"> • nach Vollendung des 18. Lebensjahrs z.B. <ul style="list-style-type: none"> - prä-, peri-, postnatale Schädigungen (z. B. Meningomyelocele, infantile Cerebralparese, Spina bifida) - zerebrale Blutung, Tumor, Hypoxie - Schädelhirn- und Rückenmarkverletzungen - Meningoencephalitis, Poliomyelitis - Querschnittssyndrome - M. Parkinson - Multiple Sklerose - Syringomyelie - Amyotrophe Lateralsklerose - Spinalis anterior Syndrom - Vorderhornkrankungen des Rückenmarks - Muskeldystrophie | a Bewegungsstörungen von Extremitäten, Rumpf- und Kopfmuskulatur z. B. mit Hemi-, Tetra-, Paraplegi/-parese | Förderung und Besserung der Motorik und Sensomotorik | A. KG-ZNS/KG <i>C. Wärmetherapie/Kältetherapie</i> | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO |
| | b Funktionsstörungen durch Muskeltonusstörungen, z.B. Spastik, auch mit Folgeerscheinungen wie Kontrakturen, zentral bedingte Muskel-Hypotonie | Regulierung des Muskeltonus, Vermeidung von Kontrakturen | A. KG-ZNS/KG <i>C. Wärmetherapie/Kältetherapie</i> | Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 30 Einheiten |
| | c zentrale Koordinationsstörungen und Störungen der Grob- und Feinmotorik wie z. B. Dystonie, choreatisch-athetotische Störungen, ataktische Störungen | Förderung und Besserung der Koordination und der Grob- und Feinmotorik, Sicherung der Mobilität | A. KG-ZNS/KG <i>C. Wärmetherapie/Kältetherapie</i> | Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich Hinweise: Störungen der Atmung, des Darmes und der Ausscheidung siehe AT oder SO Störungen des Lymphabflusses siehe LY1 Trophische Störungen siehe SO4 |

2 Erkrankungen des Nervensystems

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|---|---|---|--|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| PN periphere Nervenläsionen z. B. - periphere Paresen (auch orofazial) - Plexusparesen - Polyneuritis - Polyneuropathien - Verletzungen der Nerven | a komplette/incomplete motorische Paresen der Extremitäten | Förderung und Verbesserung der Motorik, Kraft und Ausdauer | A. KG C. <i>Elektrostimulation/ Wärmetherapie/Kältetherapie</i> | Erst-VO: • bis zu 10x/VO Folge-VO: • bis zu 10x/VO |
| | b Funktionsstörungen durch Muskeltonusstörungen, auch mit Folgeerscheinungen wie Kontrakturen, Muskel-Hypotonie | Regulierung des Muskeltonus, Vermeidung von Kontrakturen | A. KG C. <i>Elektrotherapie/ Wärmetherapie/Kältetherapie</i> | Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: • bis zu 30 Einheiten Frequenzempfehlung: • mind. 1x wöchentlich |
| | c Koordinationsstörungen und Störungen der Grob- und Feinmotorik | Förderung und Besserung der Koordination und der Grob- und Feinmotorik, Sicherung der Mobilität | A. KG | Hinweis: Störungen der Atmung, des Darmes und der Ausscheidung siehe AT oder SO Störungen des Lymphabflusses siehe LY1 Trophische Störungen siehe SO4 |

3 Erkrankungen der inneren Organe

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|---|--|---|--|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| AT1 Störungen der Atmung <ul style="list-style-type: none"> • mit prognostisch kurzzeitigem Behandlungsbedarf z. B. bei <ul style="list-style-type: none"> - Pneumonie, Pleuritis - Asthma bronchiale - Lungenfibrose - Thoraxoperation | a Atemnot, auch anfallsweise auftretend, ggf. auch Auswurf | Erlernen einer physiologischen Atmung, Verbesserung der Thoraxbeweglichkeit einschl. der Atemhilfsmuskulatur, der Expektoratorion und Hustentechnik | A. KG (Atemtherapie) C. <i>KMT/Wärmetherapie (insbesondere heiße Rolle)/Inhalation</i> | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes |
| | b Auswurf | Sekretlockerung, Sekretverflüssigung, Entzündungshemmung | A. Inhalation | |
| | c Husten, spastische Atmungsstörungen | Spasmolyse der Bronchialmuskulatur | A. BGM C. <i>Inhalation/Wärmetherapie (insbesondere heiße Rolle)</i> | |

3 Erkrankungen der inneren Organe

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|---|--|---|--|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| AT2 Störungen der Atmung <ul style="list-style-type: none"> • mit prognostisch längerdauerndem Behandlungsbedarf z. B. bei <ul style="list-style-type: none"> - ZNS-Erkrankungen - Erkrankungen des Rückenmarks - bei chronisch persistierenden Atemwegserkrankungen wie <ul style="list-style-type: none"> - Lungenfibrosen - chronischer Bronchitis - chronischem Emphysem | a Atemnot, auch anfallsweise auftretend, ggf. auch Auswurf | Erlernen einer physiologischen Atmung, Verbesserung der Thoraxbeweglichkeit einschl. der Atemhilfsmuskulatur, der Expektorations- und Hustentechnik | A. KG (Atemtherapie) C. <i>KMT/Wärmetherapie/Inhalation</i> | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 18 Einheiten davon für Massage-techniken bis zu 10 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes Hinweise: Sofern im Einzelfall verlaufsabhängig unmittelbar ein Wechsel von AT1 zu AT2 medizinisch begründet ist, ist die bereits zu AT1 erfolgte Verordnungsmenge auf die Gesamtverordnungsmenge von AT2 anzurechnen. Ein Wechsel von AT2 zu AT1 ist <u>nicht</u> möglich. |
| | b Auswurf | Sekretlockerung, Sekretverflüssigung, Entzündungshemmung | A. Inhalation | |
| | c Husten, spastische Atemstörungen | Spasmolyse der Bronchialmuskulatur | A. BGM C. <i>Inhalation/Wärmetherapie (insbesondere heiße Rolle)</i> | |

3 Erkrankungen der inneren Organe

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|---|---|---|--|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| AT3 Störungen der Atmung bei Mukoviszidose <ul style="list-style-type: none"> • mit prognostisch längerdauerndem Behandlungsbedarf bei schwerwiegenden Bronchialerkrankungen z. B. bei - Mukoviszidose - Lungenerkrankungen, die der Mukoviszidose vergleichbare pulmonale Schädigungen aufweisen | a Atemnot, auch anfallsweise auftretend | Erlernen einer physiologischen Atmung, Verbesserung der Thoraxbeweglichkeit einschl. der Atemhilfsmuskulatur, der Expektorations- und Hustentechnik | A. KG-Muko/KG-Atemtherapie C. <i>KMT/Wärmetherapie (insbesondere heiße Rolle /Inhalation)</i> | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 50 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes |
| | b Auswurf | Sekretlockerung, Sekretverflüssigung, Entzündungshemmung | A. Inhalation | |
| | c Husten, spastische Atemstörungen | Spasmolyse der Bronchialmuskulatur | A. BGM C. <i>Inhalation/Wärmetherapie</i> | |

3 Erkrankungen der inneren Organe

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|---|--|---|--|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| GE Arterielle Gefäßerkrankungen (bei konservativer Be- handlung, nach inter- ventioneller/operativer Be- handlung) z. B. - periphere arterielle Ver- schlusskrankheit (Stadium IIa und IIb nach Fontaine) - M. Raynaud - offene oder perkutane Angioplastie - peripherer Bypass - arterieller Embol/ Thrombektomie und Rekonstruktion | a Belastungsschmerz der Extre- mitäten (z. B. Claudicatio intermittens), Funktionsstörungen durch Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzung | Besserung der Durchblutung und des Stoffwechsels, Besserung von Ausdauer, Kraft und Ko- ordination | A. KG/Übungsbehandlung <i>C. Wärmetherapie/Kältetherapie</i> | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 12 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungs- programms Trophische Störungen siehe SO4 |

3 Erkrankungen der inneren Organe

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|--|--|--|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittelkombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| LY1 Lymphabflussstörungen <ul style="list-style-type: none"> • mit prognostisch kurzzeitigem Behandlungsbedarf z. B. <ul style="list-style-type: none"> - bei venöser Insuffizienz mit Hautschädigungen (z.B. Ulcus cruris) - bei postthrombotischem Syndrom - nach interventioneller/operativer Behandlung von Gefäßerkrankungen - primäre (angeborene) Schädigung des Lymphsystems - sekundäre (erworbene) Schädigung des Lymphsystems, z.B. nach Operationen, Verletzungen, Entzündungen | a schmerzlose oder schmerzhafte, zeitweise bzw. vorübergehende lymphatische/lymphostatische Schwellung | Entstauung sowie Besserung des Lymphflusses, der aktiven Muskel-Venen-Pumpe, des Haut- und Unterhautstoffwechsels, auch zur Vermeidung weiterer Sekundärkomplikationen | A. MLD-30/MLD-45/MLD-60 (einschl. Kompressionsbandagierung*) * ggf. erforderliche Kompressionsbinden sind als Verbandsmittel gesondert zu verordnen, sofern keine Hilfsmittel zur Kompressionstherapie vorhanden sind C. Kältetherapie/Elektrotherapie/Wärmetherapie (insbesondere heiße Rolle)/Übungsbehandlung | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 12 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes |
| | b Schmerzen, Funktions-, Belastungsstörungen durch lokale Schwellung (z. B. Ödem, Hämatom) | Schmerzreduktion durch Reduzierung von Schwellung und Reizung | A. MLD-30 C. Elektrotherapie/Kältetherapie | |

3 Erkrankungen der inneren Organe

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|---|--|---|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>LY2 Lymphabflussstörungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit prognostisch länger- andauerndem Be- handlungsbedarf <p>z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - primäre (angeborene) Schädigung des Lymph- systems - sekundäre (erworbene) Schädigung des Lymph- systems, z. B. nach Operationen, Be- strahlungen, Verletzungen, Entzündungen - bei venöser Insuffizienz mit Hautschädigungen (z. B. Ulcus cruris) - bei postthrombotischem Syndrom - nach interventioneller/ operativer Behandlung von Gefäßerkrankungen - primäre (angeborene) Schädigung des Lymph- systems - sekundäre (erworbene) Schädigung des Lymph- systems, z.B. nach Operationen, Be- strahlungen, Verletzungen, Entzündungen | <p>a chronisches schmerzloses oder schmerzhaftes länger be- stehendes bzw. dauerhaftes manifestes Lymphödem (auch mit Sekundärschäden an Haut und Unterhautgewebe oder mit Bewegungseinschränkungen, Stauungsdermatosen)</p> | <p>Entstauung sowie Besserung des lymphatischen Rückflusses, der aktiven Muskel-Venen-Pumpe, des Haut- und Unterhautstoff- wechsels, auch zur Vermeidung weiterer Sekundärkomplikationen</p> | <p>A. MLD-45/MLD-60 (einschl. Kompressionsbandagierung*)</p> <p>* ggf. erforderliche Kompressions- binden sind als Verbandsmittel ge- sondert zu verordnen, sofern keine Hilfsmittel zur Kompressionstherapie vorhanden sind</p> <p>C. Kältetherapie/Elektrotherapie/ Wärmetherapie (insbesondere heiße Rolle)/Übungsbehandlung</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 30 Einheiten <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich <p>Ziel: Erlernen eines Eigenübungs- programmes</p> <p>Hinweise: Sofern im Einzelfall verlaufs- abhängig unmittelbar ein Wechsel von LY1 zu LY2 medizinisch begründet ist, ist die bereits zu LY1 erfolgte Ver- ordnungsmenge auf die Gesamt- verordnungsmenge von LY2 anzurechnen.</p> <p>Ein Wechsel von LY2 zu LY1 ist <u>nicht</u> möglich.</p> |

3 Erkrankungen der inneren Organe

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|---|---|--|---|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>LY3 chronische Lymphabflussstörungen bei bösartigen Erkrankungen</p> <p>z. B. nach OP/Radiatio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mammakarzinom - Malignome Kopf/Hals - Malignome des kleinen Beckens | <p>a chronisches schmerzloses oder schmerzhaftes länger bestehendes bzw. dauerhaftes manifestes Lymphödem (auch mit Sekundärschäden an Haut und Unterhautgewebe oder mit Bewegungseinschränkungen, Stauungsdermatosen)</p> | <p>Entstauung sowie Besserung des lymphatischen Rückflusses, der aktiven Muskel-Venen-Pumpe, des Haut- und Unterhautstoffwechsels, auch zur Vermeidung weiterer Sekundärkomplikationen</p> | <p>A. MLD-45/MLD-60 (einschl. Kompressionsbandagierung*)</p> <p>* ggf. erforderliche Kompressionsbinden sind als Verbandsmittel gesondert zu verordnen, sofern keine Hilfsmittel zur Kompressionstherapie vorhanden sind</p> <p>C. Kältetherapie/Elektrotherapie/Wärmertherapie (insbesondere heiße Rolle)/Übungsbehandlung</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 50 Einheiten <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich <p>Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes</p> <p>Hinweise: Sofern im Einzelfall verlaufsabhängig unmittelbar ein Wechsel von LY2 zu LY3 medizinisch begründet ist, ist die bereits zu LY2 erfolgte Verordnungsmenge auf die Gesamtverordnungsmenge von LY3 anzurechnen.</p> <p>Ein Wechsel von LY3 zu LY2 ist <u>nicht</u> möglich.</p> |

4 Sonstige Erkrankungen

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|---|--|--|--|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>SO1 Störung der Dickdarmfunktion</p> <p>z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - neurogene Darmlähmungen bei ZNS-Erkrankungen/ Rückenmarkserkrankungen - Colon irritabile - Colitis ulcerosa - M. Crohn - Megakolon | <p>a</p> <p>vorübergehende oder dauerhafte chronische Schädigung der intestinalen Funktion mit Schmerzen, Durchfall, Obstipation oder Flatulenz</p> | <p>Besserung des Stoffwechsels Regulierung der Darmmotilität</p> | <p>A. CM/BGM</p> <p>C. <i>Wärmetherapie</i></p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 12 Einheiten <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich |
| <p>SO2 Störungen der Ausscheidung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stuhlinkontinenz - Harninkontinenz | <p>a</p> <p>motorische, funktionelle Störungen des Schließmuskels bzw. der Beckenbodenmuskulatur</p> | <p>Verbesserung der Sphinkter- und Beckenbodenmuskulatur</p> | <p>A. KG</p> <p>B. Übungsbehandlung</p> <p>C. <i>Elektrotherapie</i></p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 12 Einheiten <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich <p>Ziel: Erlernen eines Eigenübungsprogrammes</p> |

4 Sonstige Erkrankungen

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|---|--|---|--|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>SO3 Schwindel unterschiedlicher Genese und Ätiologie</p> <p>z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - benigner Lagerungsschwin- del - vestibulärer Schwindel | <p>a Gang- und Standunsicherheit, Verunsicherung, Angstzustände</p> | <p>Gewöhnung (Habituation) durch Reizexposition Beseitigung des Schwindels</p> | <p>A. KG B. Übungsbehandlung</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 12 Einheiten <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 3x wöchentlich <p>Ziel: Erlernen eines Eigenübungs- programms</p> |
| <p>SO4 periphere trophische Störungen bei Erkrankungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Stütz- und Bewegungs- organe - des Nervensystems - peripherer Gefäße | <p>a trophische Störungen, lokale Durchblutungs- und Regulations- störungen</p> | <p>Verbesserung des vegetativen Regulationsprozesses, des Stoffwechsels, der Durchblutung</p> | <p>A. CO₂-Bad C. <i>BGM/SM/PM/Elektrotherapie/ Wärmetherapie/Kältetherapie</i></p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 12 Einheiten <p>Frequenzempfehlung: mind. 2x wöchentlich</p> |

4 Sonstige Erkrankungen

| Indikation | | Ziel der Physikalischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|---|---|--|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. vorrangige Heilmittel B. optionale Heilmittel C. ergänzende Heilmittel D. standardisierte Heilmittel- kombinationen | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <u>S05</u> - Prostatitis - Adnexitis | a Schmerzen mit Schwellungen und Entzündungen | Schmerzen lindern, Entzündung hemmen | A. Wärmetherapie (Peloidbäder) C. BGM | Erst-VO: • bis zu 6x/VO Folge-VO: • bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: • bis zu 12 Einheiten Frequenzempfehlung: • mind. 2x wöchentlich |

I. B Maßnahmen der Podologischen Therapie

1 Diabetisches Fußsyndrom

Verzeichnis der gebräuchlichen Abkürzungen im Heilmittelkatalog für Podologische Therapie

| | |
|----------|-------------------|
| Erst-VO | = Erstverordnung |
| Folge-VO | = Folgeverordnung |
| /VO | = pro Verordnung |

1 Diabetisches Fußsyndrom

| Indikation | | Ziel der Podologischen Therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|---|--|---|---|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | A. Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| DF Diabetisches Fußsyndrom mit Neuropathie und/oder Angiopathie - im Stadium Wagner 0 z. B. - abgeheiltes Plantar-Ulcus | a schmerzlose und schmerzhafte Hyperkeratose | Vermeidung von drohenden Hautschädigungen wie - Fissuren - Ulzera und - Entzündungen | A. Hornhautabtragung | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 3x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6/VO Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • alle 4 bis 6 Wochen <i>Bei allen Maßnahmen erfolgen Instruktionen zur individuell durchführbaren Haut- und Fuß- pflege sowie Inspektionen des Schuhwerks und der Einlagen</i> |
| | b Pathologisches Nagel- wachstum - Verdickung - Tendenz zum - Einwachsen | Vermeidung von drohenden Nagelwall- und Nagelbett- schädigungen wie - Verletzungen und - Entzündungen | A. Nagelbearbeitung | |
| | c gleichzeitige Schädigung a und b | siehe a und b | A. Podologische Komplex- behandlung | |

II. Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie

Inhaltsübersicht

- 1 Störungen der Stimme
 - 1.1 Organische Störungen der Stimme
 - 1.2 Funktionelle Störungen der Stimme
 - 1.3 Psychogene Störungen der Stimme
- 2 Störungen der Sprache
 - 2.1 Störungen der Sprache vor Abschluss der Sprachentwicklung
 - 2.2 Störungen der Artikulation
 - 2.3 Störungen der Sprache bei hochgradiger Schwerhörigkeit oder Taubheit
 - 2.4 Störungen der Sprache nach Abschluss der Sprachenentwicklung
 - 2.5 Störungen der Sprechmotorik
- 3 Störungen des Redeflusses
- 4 Störungen der Stimm- und Sprechfunktion
- 5 Störungen des Schluckaktes

Verzeichnis der gebräuchlichen Abkürzungen im Heilmittelkatalog für Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie

| | |
|----------|---------------------|
| Erst-VO | = Erstverordnung |
| Folge-VO | = Folgeverordnung |
| /VO | = pro Verordnung |
| + | = und (zusätzlich) |
| / | = oder (alternativ) |

1 Störungen der Stimme

1.1 Organische Störungen der Stimme

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|--|---|---|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>ST1 Organisch bedingte Erkrankungen der Stimme</p> <ul style="list-style-type: none"> • lokal bedingt • ZNS bedingt • hormonell bedingt • OP-Folgen • lähmungsbedingt <p>z. B. durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kehlkopfasymmetrien - Kehlkopftraumen - Missbildungen - Stimmlippenlähmung nach internistischen und neurologischen Erkrankungen oder operativen Eingriffen - Operative Eingriffe an Stimmlippen und Kehlkopf - krankhafter Verlauf des Stimmbruchs - Zustand nach Laryngektomie | <p>Stimmstörungen mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eingeschränkter stimmlicher Belastbarkeit - Heiserkeit bis zur Aphonie - Veränderung der Stimmhöhe und Tonhöhe - gestörte Phonationsatmung - Räusperzwang, Reizhusten - Druck- und Schmerzempfindung - neuromuskuläre Störung im Halswirbelbereich | <p>Verbesserung der Stimmqualität und der stimmlichen Belastbarkeit bis zur Normalisierung oder Wiederherstellung einer stimmlichen Kommunikationsfähigkeit</p> | <p>Stimmtherapie</p> <p>30 oder 45 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 20 Einheiten <p>weiterführende Diagnostik nach 10 Einheiten erforderlich, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Videostroboskopie - Stimmfeldmessung - Elektroglottographie - Klärung psychogener Ursachen <p>zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikationsstellung operativer Maßnahmen oder Abklärung einer Rehabilitationsnotwendigkeit - Beendigung oder Begründung der Fortsetzung der Verordnung <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich |

1 Störungen der Stimme

1.2 Funktionelle Störungen der Stimme

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|--|---|---|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>ST2 Funktionell bedingte Erkrankungen der Stimme</p> <p>z. B. durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - hypofunktionelle Dysphonie - hyperfunktionelle Dysphonie | <p>Stimmstörungen in Form von</p> <ul style="list-style-type: none"> - eingeschränkter stimmlicher Belastbarkeit - Heiserkeit bis zur Aphonie - Veränderung der Stimmlage, Tonhöhe und -umfang - gestörte Phonationsatmung - Räusperzwang, Reizhusten - Druck- und Schmerzempfindung - fehlende stimmliche Kommunikationsfähigkeit | <p>Verbesserung der Stimmqualität und der stimmlichen Belastbarkeit bis zur Normalisierung oder Wiederherstellung einer stimmlichen Kommunikationsfähigkeit</p> | <p>Stimmtherapie</p> <p>30 oder 45 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 20 Einheiten <p>weiterführende Diagnostik nach 10 Einheiten erforderlich, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Videostroboskopie - Stimmfeldmessung - Elektrolottographie - Klärung psychogener Ursachen <p>zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikationsstellung operativer Maßnahmen oder Abklärung einer Rehabilitationsnotwendigkeit - Beendigung oder Begründung der Fortsetzung der Verordnung <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich |

1 Störungen der Stimme
1.3 Psychogene Störungen der Stimme

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|---|--|--|--|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| ST3 Psychogene Erkrankungen der Stimme Aphonie | Plötzlich eingetretene Stimmlosigkeit | Wiederherstellung der stimm- lichen Kommunikationsfähigkeit | Stimmtherapie 30/45 oder 60 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbar- keit der Patientin oder des Patienten | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 5x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • keine Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 5 Einheiten Frequenzempfehlung: täglich, bis zu mehrere Einheiten pro Tag ggf. Einleitung einer Psychotherapie |

1 Störungen der Stimme

1.3 Psychogene Störungen der Stimme

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|---|--|--|--|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| ST4 Psychogene Erkrankungen der Stimme Dysphonie | Stimmstörungen in Form von - Heiserkeit bis zur Aphonie - fehlender bzw. eingeschränkter stimmlicher Kommunikationsfähigkeit - eingeschränkter stimmlicher Belastbarkeit - gestörter Phonationsatmung | Verbesserung der Stimmqualität und der stimmlichen Belastbarkeit bis zur Normalisierung oder Wiederherstellung einer stimmlichen Kommunikationsfähigkeit | Stimmtherapie 30 oder 45 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 20 Einheiten weiterführende Diagnostik erforderlich nach 10 Einheiten insbesondere - Videostroboskopie - Stimmfeldmessung - Elektrolottographie - Klärung psychogener Ursachen zur - Abklärung einer Rehabilitationsnotwendigkeit - Beendigung oder Begründung der Fortsetzung der Verordnung Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich |

2 Störungen der Sprache

2.1 Störungen der Sprache vor Abschluss der Sprachentwicklung

| Indikation | | | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|--|---|--|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | Heilmittel |
| <p>SP1 Störungen der Sprache vor Abschluss der Sprachentwicklung</p> <p>z. B. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsstörungen - frühkindlichen Hirnschädigungen - peripheren und zentralen Hörstörungen - peripheren Anomalien der Sprechorgane - genetisch bedingten Krankheiten - Mehrfachbehinderungen - familiärer Sprachschwäche mit Krankheitswert | <p>Sprachentwicklungsstörungen in Form von</p> <ul style="list-style-type: none"> - eingeschränktem aktiven und passiven Wortschatz und/oder Wortfindungsstörungen und/oder - Störungen des Satzbaues und der Flexionsformen (Dysgrammatismus) und/oder - Störungen der Diskrimination, Selektion und Bildung von Sprachlauten und/oder - Störungen der auditiven Merkspanne/des auditiven Gedächtnisses und/oder - Störung der Motorik und motorischer Koordination bei Respiration, Phonation und Artikulation | <p>Verbesserung bzw. Normalisierung der sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten</p> | <p>Sprech- und Sprachtherapie</p> <p>30 oder 45 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 60 Einheiten <p>weiterführende Diagnostik erforderlich vor bzw. während der 10 Einheiten der Erst-VO bzw. nach einem Therapiezeitraum von 3 Monaten; insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsdiagnostik - Sprach- und Sprechanalyse - zentrale Hördiagnostik - neuropädiatrische/neurologische Untersuchung <p>zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklärung einer Rehabilitationsnotwendigkeit - Beendigung oder Begründung der Fortsetzung der Verordnung <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich |

2 Störungen der Sprache
2.1 Störungen der Sprache vor Abschluss der Sprachentwicklung

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|---|--|---|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| SP2 Störungen der auditiven Wahrnehmung | Störungen der zentralen Hör- funktionen | Verbesserung bzw. Normalisierung der sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten | Sprachtherapie 30 oder 45 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungs- bild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten Verordnungsfähig nur auf- grund einer neuropsycho- logischen Untersuchung und zentralen Hördiagnostik | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 20 Einheiten Eine weiterführende Diagnostik ist nach 10 Einheiten erforderlich; insbesondere: - Entwicklungsdiagnostik - zentrale Hördiagnostik zur - Abklärung einer Rehabilitations- notwendigkeit - Beendigung oder Begründung der Fortsetzung der Verordnung Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich |

2 Störungen der Sprache 2.2 Störungen der Artikulation

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|--|---|--|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>SP3 Störungen der Artikulation</p> <p>Dyslalie</p> <p>z. B. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hörstörungen - frühkindlichen Hirnschäden - orofazialen Störungen - Anomalien der Zahnstellung des Kiefers und des Gaumens im Rahmen einer sprachlichen Reifungsstörung | <p>Störungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - in der Laut- und Lautverbindungsbildung - des orofazialen Muskelgleichgewichts - der rezeptiven Diskrimination und der zentralen phonologischen und expressiv phonetischen, motorischen Musterbildung (außer Entwicklungsstammeln) | <p>Normalisierung und Verbesserung der Laut- und Lautverbindungsbildung</p> | <p>Sprech- und Sprachtherapie</p> <p>30 oder 45 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 30 Einheiten <p>weiterführende Diagnostik nach 10 Einheiten erforderlich; insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsdiagnostik - zentrale Hördiagnostik - Sprach- und Sprechanalyse - kieferorthopädische Diagnostik <p>zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beendigung oder Fortsetzung der Therapie <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

2 Störungen der Sprache

2.3 Störungen der Sprache bei hochgradiger Schwerhörigkeit oder Taubheit

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>SP4 Störungen der Sprache bei hochgradiger Schwerhörigkeit oder Taubheit</p> <p>z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - angeboren - erworben durch Infektionen, ototoxisch, Traumata, Hörsturz, Mißbildungen, Tubenbelüftungsstörung - nach Cochlea-Implantat-Versorgung | <p>Störungen in Form von</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestörter bzw. fehlender lautsprachlicher Kommunikation | <p>Ausbildung der Lautsprache zur sprachlichen Kommunikation Erhalt der Lautsprache</p> | <p>Sprachtherapie</p> <p>30 / 45 oder 60 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 20x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 50 Einheiten <p>weiterführende Diagnostik nach 10 Einheiten erforderlich, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentrale Hördiagnostik - Hörgeräteüberprüfung - Sprachprozessorüberprüfung <p>zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beendigung od. Fortsetzung der Therapie - Indikationsstellung zur Rehabilitationsnotwendigkeit - möglichen Hörgeräteumversorgung - Entwicklung und dem Aufbau einer alternativen Kommunikation <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich |

2 Störungen der Sprache

2.4 Störungen der Sprache nach Abschluss der Sprachentwicklung

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|---|--|---|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>SP5 Störungen der Sprache nach Abschluß der Sprachentwicklung</p> <p>Aphasien/Dysphasien</p> <p>z. B. durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - ischämische Insulte - intracerebrale Blutungen - Subarachnoidalblutungen - Hirnkontusionen - Encephalitiden - Hirntumoren - Hirnoperation - degenerative Erkrankungen - Schädel-Hirn-Traumen | <p>Störungen im Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Wortfindung - des Sprechens - des Lesens - des Schreibens - der Artikulation - des Satzbaus - des Sprachverständnisses <p>in Begleitung von neurologischen, psychischen und neuropsychologischen Störungen</p> | <p>Verbesserung der sprachlichen Fähigkeit bis zur Normalisierung oder Erreichen einer sprachlichen Kommunikationsfähigkeit</p> <p>Erforderlichenfalls Schaffung nonverbaler Kommunikationsmöglichkeiten</p> | <p>Sprachtherapie</p> <p>30 / 45 oder 60 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 20x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 60 Einheiten <p>geeignete standardisierte Tests (z. B. AAT) zu Beginn und im Verlauf der Therapie erforderlich (Eingangstest bis spätestens zur 5. laufenden Therapiesitzung); weiterführende Diagnostik nach 30 Einheiten erforderlich; insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - audiologische Diagnostik - neurologische Untersuchung - neuropsychologische Diagnostik <p>zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beendigung oder Fortsetzung der Therapie - Abklärung einer Rehabilitationsnotwendigkeit <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

2 Störungen der Sprache

2.5 Störungen der Sprechmotorik

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|--|--|---|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>SP6 Störungen der Sprechmotorik</p> <p>Dysarthrie/Dysarthrophonie/ Sprechapraxie</p> <p>z. B. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - cerebralen Durchblutungsstörungen - Tumorerkrankungen - Entzündungen - Traumata - infantilen Cerebralpareesen - Bulbärparalysen - Choreatischen Krankheitsbildern - Multipler Sklerose - Amyotrophen Lateralsklerosen - Ataxien - Myasthenia gravis - Dystonien | <p>Störungen der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stimmgebung - Sprechatmung - neuralen Steuerungs- und Regelungsmechanismen hinsichtlich der Sprechmotorik (z. B. Schwäche, Verlangsamung, Fehlkoordination, veränderter Muskeltonus, hyperkinetische Symptome) - Prosodie - Artikulation | <p>Verbesserung bzw. Normalisierung des Sprechens</p> <p>Erreichen einer Kommunikationsfähigkeit (erforderlichenfalls Schaffung nonverbaler Kommunikationsmöglichkeiten)</p> | <p>Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie</p> <p>30/45 oder 60 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 20x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 60 Einheiten <p>geeignete standardisierte Tests (z. B. Frenchay-D.-Test) zu Beginn und im Verlauf der Therapie erforderlich (Eingangstest bis spätestens zur 5. laufenden Therapiesitzung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - weiterführende Diagnostik nach 30 Einheiten erforderlich; insbesondere: - audiologische Diagnostik - endoskopische Diagnostik - neuropsychol. Diagnostik - elektrophysiol. Diagnostik <p>zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beendigung oder Fortsetzung der Therapie - Abklärung einer Rehabilitationsnotwendigkeit <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

3 Störungen des Redeflusses

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|---|---|---|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>RE1 Störungen des Redeflusses</p> <p>Stottern z. B. durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - hirnorganische Ursachen - psychische Ursachen - konstitutionelle Ursachen - traumatische Ursachen <p>Physiologische Sprechunflüssigkeiten sind keine Indikation für Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie</p> | <p>Störungen des Redeflusses in Form von</p> <ul style="list-style-type: none"> - klonischen Laut-, Silben- und Wortwiederholungen - Dehnungen oder tonischen Blockierungen - ausgeprägtem Störungsbewußtsein - Vermeidungsverhalten - mimischen und ganzkörperlichen Mitbewegungen | <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung bzw. Normalisierung des Redeflusses unter Berücksichtigung der Entwicklungsphase - Aufbau von Kommunikationsstrategien - Koordinierung von Atmungs- und Sprechablauf - Regulierung der Phonationsatmung - Abbau der Begleitsymptomatik - Aufklärung des sozialen Umfeldes | <p>Sprechtherapie</p> <p>30/45 oder 60 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 50 Einheiten <p>VO, wenn möglich, als Gruppentherapie;</p> <p>weiterführende Diagnostik nach 10 Einheiten erforderlich, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsdiagnostik bzw. Hirnleistungsdiagnostik - Sprachanalyse - neurolog./psychiatrische Untersuchung - neuropädiatrische Untersuchung <p>zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beendigung od. Fortsetzung der Therapie - Abklärung einer Rehabilitationsnotwendigkeit - Abklärung einer psychotherapeutischen Behandlung <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

3 Störungen des Redeflusses

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|---|--|---|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| RE2 Poltern z. B. durch - hirnrorganische Ursachen - konstitutionelle Ursachen | Störungen des Redeflusses in Form von - einem ausgeprägten Störungsbewußtsein - einem überhasteten und beschleunigten Sprechablauf - undeutlicher und verwaschener Artikulation | - Verbesserung bzw. Normalisierung des Redeflusses - Aufbau gezielter Steuerungsvorgänge - Verbesserung der Artikulation - Aufklärung des sozialen Umfeldes | Sprechtherapie 30 oder 45 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten | Erst-VO: • bis zu 10x/VO Folge-VO: • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: • bis zu 20 Einheiten VO, wenn möglich, als Gruppentherapie; Frequenzempfehlung: • mind. 1x wöchentlich |

4 Störungen der Stimm- und Sprechfunktion

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|--|--|---|--|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| SF Störungen der Stimm- und Sprechfunktion Rhinophonie z. B. <ul style="list-style-type: none"> - entzündlich bedingt - neurologisch bedingt - degenerativ bedingt - Tumor bedingt - funktionell bedingt - Operationsfolgen - Lippen-Kiefer-Gaumen-Trauma | Störungen in Form <ul style="list-style-type: none"> - eines dumpfen farblosen, nasalsten Stimmklanges - verwaschener Sprache - einer Entstellung von Vokalen und Konsonanten bis zur Unkenntlichkeit - einer Hyperfunktion der Kehlkopf- und Zungenmuskulatur mit Stimmveränderungen und Atemstörungen | Verbesserung bzw. Normalisierung <ul style="list-style-type: none"> - des Sprachklanges - der Hyperfunktion der Kehlkopf- und Zungenmuskulatur und der Stimmveränderungen - der Atemstörungen | Sprech- und Sprachtherapie 30 oder 45 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten | Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 20 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

5 Störungen des Schluckaktes

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|---|---|---|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>SC1 Krankhafte Störungen des Schluckaktes</p> <p>Dysphagie (Schluckstörung, soweit sie nicht primär eine Indikation zur Operation darstellt)</p> <p>z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cerebrale Durchblutungsstörungen - Tumor - Entzündungen - Trauma - infantile Cerebralpareesen - Bulbärparalysen - Morbus Parkinson - Multipler Sklerose - Amyotrophen Lateralsklerosen - Ataxien - Dystonien - Mysathenia gravis | <p>Störungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - des Schluckaktes (motorisch und sensorisch) in der oralen, pharyngealen und oesophagealen Phase - in Form einer Aspirationsgefahr der Stimme | <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung bzw. Normalisierung des Schluckaktes - ggf. Erarbeitung von Kompensationsstrategien - Ermöglichung der oralen Nahrungsaufnahme | <p>Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie</p> <p>30/45 oder 60 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 60 Einheiten <p>weiterführende Diagnostik nach 10 Einheiten erforderlich, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - endoskopische Untersuchungen - Videostroboskopie - Röntgenkontrastuntersuchungen - Sonographie - neurolog. Untersuchung <p>zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beendigung oder Fortsetzung der Therapie - Abklärung operativer Maßnahmen <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

5 Störungen des Schluckaktes

| Indikation | | Ziel der Stimm-, Sprech- und Sprach- therapie | Heilmittelverordnung im Regelfall | |
|--|---|---|---|---|
| Diagnosengruppe | Leitsymptomatik: Funktionelle/strukturelle Schädigung | | Heilmittel | Verordnungsmengen je Diagnose ----- weitere Hinweise |
| <p>SC2 Schädigungen im Kopf-Hals-Bereich</p> <p>z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operationsfolgen | <p>Störungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - des Schluckaktes (motorisch und sensorisch) in der oralen, pharyngealen und oesophagealen Phase - in Form einer Aspirationsgefahr der Stimme | <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung bzw. Normalisierung des Schluckaktes - ggf. Erarbeitung von Kompensationsstrategien - Ermöglichung der oralen Nahrungsaufnahme | <p>Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie</p> <p>30/45 oder 60 Minuten mit der Patientin oder dem Patienten, je nach konkretem Störungsbild und Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten</p> | <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 30 Einheiten <p>weiterführende Diagnostik nach 10 Einheiten erforderlich, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - endoskopische Untersuchungen - Videostroboskopie - Röntgenkontrastuntersuchungen - Sonographie - neurolog. Untersuchung <p>zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beendigung oder Fortsetzung der Therapie - Abklärung operativer Maßnahmen <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

III. Maßnahmen der Ergotherapie

Inhaltsübersicht

- 1 Erkrankungen des Stütz- und Bewegungssystems
 - 1.1 Wirbelsäulenerkrankungen
 - 1.2 Becken- und Extremitätenverletzungen/-operationen
 - 1.3 Knochen-, Gelenk- und Weichteilerkrankungen
 - 1.4 Gefäß-, Muskel- und Bindegewebserkrankungen
- 2 Erkrankungen des Nervensystems
 - 2.1 ZNS-Schädigungen
 - 2.2 Rückenmarkserkrankungen
 - 2.3. Erkrankungen peripherer Nerven
- 3 Psychische Störungen
 - 3.1 Geistige und psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter
 - 3.2 Neurotische, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
 - 3.3 Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen, affektive Störungen
 - 3.4 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
 - 3.5 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen

Verzeichnis der gebräuchlichen Abkürzungen im Heilmittelkatalog für Ergotherapie

| | |
|----------|-------------------|
| Erst-VO | = Erstverordnung |
| Folge-VO | = Folgeverordnung |

| | |
|-----|---------------------|
| /VO | = pro Verordnung |
| + | = und (zusätzlich) |
| / | = oder (alternativ) |

1 Erkrankungen des Stütz- und Bewegungssystems

1.1 Wirbelsäulenerkrankungen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|--|--|--|--|---|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| SB1 Wirbelsäulenerkrankungen z. B. bei - M. Bechterew - rheumatoide Arthritis mit Befall der Wirbelsäule - WS-Frakturen (auch postoperativ) | 1. aktive und passive Bewegungsstörungen 2. Schmerz 3. Störung der Haltung | Einschränkung: 1. der Selbstversorgung/ Alltagsbewältigung 2. der Beweglichkeit | - Selbständigkeit in der Selbstversorgung (z. B. Ankleiden/ Hygiene/Haushalt) - Verbesserung der körperlichen Beweglichkeit - Steigerung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer - Verminderung der schmerzbedingten Reaktionen - Erlernen von Kompensationsmechanismen | A. Motorisch-funktionelle Behandlung Erst-VO: • bis zu 10x/VO Folge-VO: • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: • 20 Einheiten Frequenzempfehlung: • mind. 1x wöchentlich |

1 Erkrankungen des Stütz- und Bewegungssystems

1.2 Becken- und Extremitätenverletzungen/-operationen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|--|--|--|---|--|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| SB2 Störungen nach <ul style="list-style-type: none"> • traumatischer Schädigung • Operationen • Verbrennungen • Verätzungen <p>vorwiegend im Bereich Schulter, Arm, Hand</p> <p>z. B. nach</p> <ul style="list-style-type: none"> - Endoprothesen-Implantationen - Arthrodesen - Kontrakturen/Narben | <ol style="list-style-type: none"> 1. aktive und passive Bewegungsstörungen 2. Kontrakturen, Narbenzüge 3. Schmerz 4. Störungen der Körperwahrnehmung 5. Sensibilitätsstörungen | Einschränkung: <ol style="list-style-type: none"> 1. der Selbstversorgung/Alltagsbewältigung 2. der Beweglichkeit und Geschicklichkeit | <ul style="list-style-type: none"> - Selbständigkeit in der Selbstversorgung (Ankleiden/Hygiene) - Verbesserung der körperlichen Beweglichkeit - Verbesserung der manuellen Geschicklichkeit - Steigerung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer - Erlernen von Kompensationsmechanismen | A. Motorisch-funktionelle Behandlung* B. sensomotorisch-perzeptive Behandlung* C. <i>Thermische Anwendungen</i> <p>*ggf. erforderliche ergotherapeutische Schienen sind gesondert zu verordnen</p> Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 20 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich |

1 Erkrankungen des Stütz- und Bewegungssystems

1.2 Becken- und Extremitätenverletzungen/-operationen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|--|---|--|--|--|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| SB3 Amputationen • nach Abschluß der Wundheilung Angeborene Fehlbildungen z.B. - Dysmeliesyndrom vorwiegend Arm/Hand-Region | 1. Bewegungsstörungen durch z.B. Kontrakturen, auch benachbarter Gelenke 2. Muskelinsuffizienz, -verkürzung 3. Sensibilitätsstörungen (z.B. des Stumpfes) 4. Schmerz 5. Störungen der Körperwahrnehmung | Einschränkung: 1. der Selbstversorgung / Alltagsbewältigung 2. der Beweglichkeit und Geschicklichkeit | <ul style="list-style-type: none"> - Erlernen des Umgangs mit der Prothese - Selbständigkeit in der Selbstversorgung (Ankleiden/Hygiene) - Verbesserung der körperlichen Beweglichkeit - Verbesserung der manuellen Geschicklichkeit - Steigerung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer - Erlernen von Kompensationsmechanismen | A. Motorisch-funktionelle Behandlung B. sensomotorisch-perzeptive Behandlung C. <i>Thermische Anwendungen</i> Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 30 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich Verordnung bei Amputationen nur bis zu 9 Monate nach Operation möglich |

1 Erkrankungen des Stütz- und Bewegungssystems

1.3 Knochen-, Gelenk- und Weichteilerkrankungen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| SB4 Gelenkerkrankungen Vorwiegend Schulter/ Ellbogen/Hand mit prognostisch kurz- zeitigem Behandlungs- bedarf z. B. - reaktive Arthritis degenerativ/traumatisch - Arthritis psoriatica - Arthritis bei Kollagenosen - Schultersteife - Arthrosen | 1. Bewegungsstörungen der Gelenke mit Bewegungseinschränkungen, Instabilität/Deviation, Subluxation 2. Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzung 3. Schmerzen | Einschränkung: 1. der Selbstversorgung/Alltagsbewältigung 2. der Beweglichkeit und Geschicklichkeit | - Selbständigkeit in der Selbstversorgung (Ankleiden/Hygiene) - Verbesserung und Erhalt der körperlichen Beweglichkeit - Verbesserung der manuellen Geschicklichkeit - Wiederherstellung/Besserung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer - Erlernen von Kompensationsmechanismen | A. Motorisch-funktionelle Behandlung Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 6 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 2x wöchentlich |
|--|--|--|---|---|

1 Erkrankungen des Stütz- und Bewegungssystems

1.3 Knochen-, Gelenk- und Weichteilerkrankungen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <p>SB5 Gelenkerkrankungen/ Störung der Gelenkfunktion mit prognostisch längerdauerndem Behandlungsbedarf</p> <p>z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arthritis/Arthrose - rheumatoide Arthritis und Sonderformen - Arthritis psoriatica - Arthritis bei Kollagenosen - Schultersteife - Arthrogryposis congenita | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bewegungsstörungen der Gelenke mit Bewegungseinschränkungen, Instabilität/Deviation, Subluxation 2. Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzung 3. Schmerzen | <p>Einschränkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Selbstversorgung/Alltagsbewältigung 2. der Beweglichkeit und Geschicklichkeit | <ul style="list-style-type: none"> - Selbständigkeit in der Selbstversorgung (Ankleiden/Hygiene) - Verbesserung und Erhalt der körperlichen Beweglichkeit - Verbesserung der manuellen Geschicklichkeit - Wiederherstellung/Besserung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer - Erlernen von Kompensationsmechanismen | <p>A. Motorisch-funktionelle Behandlung*</p> <p>C. <i>Thermische Anwendungen</i></p> <p>*ggf. erforderliche ergotherapeutische Schienen sind gesondert zu verordnen</p> <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 20 Einheiten <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich <p>Hinweise: Sofern verlaufsabhängig ein Wechsel von SB4 zu SB5 medizinisch begründet ist, ist die bereits zu SB4 erfolgte Verordnungsmenge auf die Gesamtverordnungsmenge der SB5 anzurechnen. Ein Wechsel von SB5 zu SB4 ist <u>nicht</u> möglich.</p> |
|---|--|--|---|---|

1 Erkrankungen des Stütz- und Bewegungssystems

1.3 Knochen-, Gelenk- und Weichteilerkrankungen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|---|---|--|---|--|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| SB6 Sympathische Reflexdystrophie Sudeck'sches Syndrom CRPS (chronisch regionales Schmerzsyndrom) - Stadium II und III vorwiegend obere Extremität | 1. Bewegungsstörungen, Schonhaltung 2. lokale Durchblutungs- und Regulationsstörungen 3. Schmerzen 4. Sensibilitätsstörungen | Einschränkung: 1. der Selbstversorgung/Alltagsbewältigung 2. der Beweglichkeit und Geschicklichkeit | <ul style="list-style-type: none"> - Selbständigkeit in der Selbstversorgung (Ankleiden/Hygiene) - Verbesserung der körperlichen Beweglichkeit - Verbesserung der manuellen Geschicklichkeit - Steigerung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer - Erlernen von Kompensationsmechanismen | A. Motorisch-funktionelle Behandlung* B. Sensomotorisch-perzeptive Behandlung* C. Thermische Anwendungen *ggf. erforderliche ergotherapeutische Schienen sind gesondert zu verordnen Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 30 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

1 Erkrankungen des Stütz- und Bewegungssystems
1.4 Gefäß-, Muskel- und Bindegewebserkrankungen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|---|--|---|---|---|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| SB7 Erkrankungen mit Gefäß-, Muskel- und Bindegewebsbeteiligung, insbesondere systemische Erkrankungen z. B. - Muskeldystrophie - Myotonie - Myasthenie - Sklerodermie - Dermatomyositis - Lupus erythematodes - Polymyositis - Sharp Syndrom | 1. Störung von Koordination, Kraft 2. Störung der Grob- und Feinmotorik 3. Störung der Körperwahrnehmung | Einschränkung: 1. der Selbstversorgung/Alltagsbewältigung 2. der Beweglichkeit/Fortbewegung und Geschicklichkeit | - Selbständigkeit in der Selbstversorgung (Ankleiden/Hygiene/Exkretion) - Erhalt/Verbesserung der körperlichen Beweglichkeit - Erhalt/Verbesserung der manuellen Geschicklichkeit - Erhalt der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer - Erlernen von Kompensationsmechanismen | A1. Motorisch-funktionelle Behandlung* A2. Sensomotorisch-perzeptive Behandlung* *ggf. erforderliche ergotherapeutische Schienen sind gesondert zu verordnen Erst-VO: • bis zu 10x/VO Folge-VO: • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: • bis zu 30 Einheiten Frequenzempfehlung: • mind. 1x wöchentlich |

2 Erkrankungen des Nervensystems

2.1 ZNS-Schädigungen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|---|---|--|---|--|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| EN1 ZNS-Erkrankungen und/oder Entwicklungsstörungen längstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs z. B. - Schädelhirntrauma - Meningoencephalitis - zerebrale Blutung - zerebraler Tumor - zerebrale Hypoxie - Cerebralparese - genetisch bedingte, peri-/postnatale Strukturschäden | 1. der Körperhaltung, Körperbewegung und Koordination 2. der Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung 3. der kognitionsstützenden und höheren kognitiven Funktionen, wie: - Aufmerksamkeit - Konzentration - Ausdauer - psychomotor. Tempo und Qualität - Handlungsfähigkeit und Problemlösung einschl. der Praxis | Einschränkung: 1. der Beweglichkeit, Geschicklichkeit 2. der Selbstversorgung und Alltagsbewältigung 3. in der zwischenmenschlichen Interaktion 4. im Verhalten | <ul style="list-style-type: none"> - Selbständigkeit in der altersentsprechenden Versorgung (Ankleiden/Hygiene) - Verbesserung der körperlichen Beweglichkeit und der Geschicklichkeit - Verbesserung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer - Verbesserung im Verhalten und in zwischenmenschlichen Beziehungen - Erlernen von Kompensationsmechanismen | A1. Sensomotorisch-perzeptive Behandlung* A2. Motorisch-funktionelle Behandlung* A3. Hirnleistungstraining/neuropsychologisch orientierte Behandlung B. Psychisch-funktionelle Behandlung C. <i>Thermische Anwendung, nur als Ergänzung zu A1./A2.</i> <i>*ggf. erforderliche ergotherapeutische Schienen sind gesondert zu verordnen</i> Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 60 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich störungsbildabhängige Zwischendiagnostik nach 20 Behandlungen erforderlich |

2 Erkrankungen des Nervensystems 2.1 ZNS-Schädigungen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|--|--|--|---|---|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukurelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| EN2 ZNS-Erkrankungen nach Vollendung des 18. Lebensjahrs z.B. - Schädelhirntrauma - M. Parkinson - Multiple Sklerose - Apoplex, Blutung zerebraler Tumor - Z. n. zerebraler Hypoxie - Cerebralparese | 1. der Körperhaltung, Körperbewegung und Koordination 2. der Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung 3. der geistigen und psychischen Funktionen/Stimmungen 4. des Gesichtsfeldes in Verbindung mit und ohne Neglect 5. der kognitionsstützenden und höheren kognitiven Funktionen wie: - Aufmerksamkeit - Konzentration - Ausdauer - Psychomotor. Tempo und Qualität - Handlungsfähigkeit und Problemlösung einschl. der Praxie | Einschränkung: 1. der Beweglichkeit, Geschicklichkeit 2. der Selbstversorgung und Alltagsbewältigung 3. in der zwischenmenschlichen Interaktion 4. im Verhalten | - Selbständigkeit in der altersentsprechenden Versorgung (Ankleiden/Hygiene) - Verbesserung der körperlichen Beweglichkeit und der Geschicklichkeit - Verbesserung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer - Verbesserung im Verhalten und in zwischenmenschlichen Beziehungen - Erlernen von Kompensationsmechanismen | A1. Sensomotorisch perzeptive Behandlung* A2. Motorisch-funktionelle Behandlung* A3. Hirnleistungstraining/neuropsychologisch orientierte Behandlung B. Psychisch-funktionelle Behandlung C. <i>Thermische Anwendung, nur als Ergänzung zu A1./A2.</i> *ggf. erforderliche ergotherapeutische Schienen sind gesondert zu verordnen Erst-VO: • bis zu 10x/VO Folge-VO: • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: • bis zu 40 Einheiten Frequenzempfehlung: • mind. 1x wöchentlich |

2 Erkrankungen des Nervensystems 2.2 Rückenmarkserkrankungen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|---|--|--|---|---|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen< der Aktivitäten< (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| <p>EN3 Rückenmarks- erkrankungen</p> <p>z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Querschnitts- syndrom, komplett/ inkomplett - Vorderhorn- schädigungen (z. B. Poliomyelitis) - Amyotrophe Lateral- sklerose (ALS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. in der Koordination und aktiven Körperbewegung bei <ul style="list-style-type: none"> • Paraparese/Paraplegie • Tetraparese/Tetraple- gie 2. der Sensibilität und Körperwahrnehmung | <p>Einschränkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der körperlichen Beweglichkeit und Geschicklichkeit 2. der Selbstversorgung und Alltagsbewältigung 3. in der Kommunikation | <ul style="list-style-type: none"> - Selbständigkeit in der Selbstver- sorgung (Ankleiden/Hygiene) - Verbesserung der körperlichen Beweglichkeit und Geschicklich- keit - Erlernen von Kompensations- mechanismen - Wiederherstellung/Verbesserung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer | <p>A1. Sensomotorisch-perzeptive Be- handlung*</p> <p>A2. Motorisch-funktionelle Behandlung*</p> <p>B. Psychisch-funktionelle Behandlung</p> <p style="text-align: center;">*ggf. erforderliche ergotherapeutische Schiene sind gesondert zu verordnen</p> <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regel- falls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 40 Einheiten <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

2 Erkrankungen des Nervensystems
2.3 Erkrankungen peripherer Nerven

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|---|---|--|---|--|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| EN4 periphere Nervenläsionen z. B. bei - Plexusparese - periphere Parese - Polyneuropathie | 1. Störung der Grob- und Feinmotorik, Koordination 2. Störungen der Sensibilität und Körperwahrnehmung | Einschränkung: 1. der körperlichen Beweglichkeit/ Geschicklichkeit 2. der Selbstversorgung und Alltagsbewältigung | <ul style="list-style-type: none"> - Selbständigkeit in der Selbstversorgung (Ankleiden/Hygiene) - Verbesserung der körperlichen Beweglichkeit und Geschicklichkeit - Erlernen von Kompensationsmechanismen - Wiederherstellung/Verbesserung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer | A1. Sensomotorisch-perzeptive Behandlung* A2. Motorisch-funktionelle Behandlung* *ggf. erforderliche ergotherapeutische Schienen sind gesondert zu verordnen Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 20 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • 1-3x wöchentlich |

3 Psychische Störungen

3.1 Geistige und psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|--|---|--|--|--|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| <p>PS1 Entwicklungsstörungen</p> <p>z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - frühkindlicher Autismus <p>Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in Kindheit und Jugend</p> <p>z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Störung des Sozialverhaltens - depressive Störung/ Angststörung - Essstörungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. in der Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung 2. des psychomotorischen Tempos und der Qualität 3. der kognitionsstützenden und höheren kognitiven Funktionen 4. der emotionalen und Willensfunktionen | <p>Einschränkung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Selbstversorgung und Alltagsbewältigung 2. im Verhalten 3. in der zwischenmenschlichen Interaktion 4. der Beweglichkeit und Geschicklichkeit | <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des situationsgerechten Verhaltens - Verbesserung der Beziehungsfähigkeit - Selbstständigkeit in der altersentsprechenden Selbstversorgung - Verbesserung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer | <p>A1. Psychisch-funktionelle Behandlung A2. Hirnleistungstraining/neuropsychologisch orientierte Behandlung</p> <p>B. Sensomotorisch-perzeptive Behandlung</p> <p>Verordnung nur möglich aufgrund einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diagnostik</p> <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 Einheiten <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

3 Psychische Störungen

3.2 Neurotische, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|--|--|--|---|---|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| <p>PS2 Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen</p> <p>z. B. - Angststörung</p> <p>Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen oder Faktoren</p> <p>z. B. - Essstörung</p> <p>Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen</p> <p>z. B. - Borderline-Störung</p> | <p>1. der emotionalen und Willensfunktionen</p> <p>2. der Anpassungs- und Verhaltensmuster</p> | <p>Einschränkung:</p> <p>1. im Verhalten</p> <p>2. in der zwischenmenschlichen Interaktion</p> <p>3. in der Selbstversorgung und Alltagsbewältigung</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des situationsgerechten Verhaltens, auch der sozio-emotionalen Kompetenzen und Interaktionsfähigkeit - Verbesserung der Tagesstrukturierung - Verbesserung der Beziehungsfähigkeit - Selbstständigkeit in der Selbstversorgung - Verbesserung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer - Verbesserung der Tagesstrukturierung | <p>A. Psychisch-funktionelle Behandlung</p> <p>Verordnung nur möglich aufgrund einer psychiatrischen Eingangsdiagnostik</p> <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 40 Einheiten <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

3 Psychische Störungen

3.3 Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen, affektive Störungen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|---|---|---|---|---|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/stukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| <p>PS3 Schizophrenie, schizotyp und wahnhaftige Störungen</p> <p>z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - postschizophrene Depression <p>affektive Störungen</p> <p>z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - depressive Episode | <ol style="list-style-type: none"> 1. des Denkens/der Denkinhalte 2. der Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung 3. der emotionalen und Willensfunktionen 4. der Verhaltensmuster 5. der kognitionsstützenden und höheren kognitiven Funktion | <p>Einschränkung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. im Verhalten 2. in der zwischenmenschlichen Interaktion 3. der Selbstversorgung und Alltagsbewältigung 4. der Beweglichkeit und Geschicklichkeit | <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des situationsgerechten Verhaltens, auch der sozio-emotionalen Kompetenzen und Interaktionsfähigkeit - Selbstständigkeit in der Selbstversorgung - Verbesserung der Beziehungsfähigkeit - Verbesserung der Tagesstrukturierung - Verbesserung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer | <p>A. Psychisch-funktionelle Behandlung</p> <p>B. Hirnleistungstraining/neuropsychologisch orientierte Behandlung</p> <p>Verordnung nur möglich aufgrund einer psychiatrischen Eingangsdiagnostik</p> <p>Erst-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Folge-VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO <p>Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 40 Einheiten <p>Frequenzempfehlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

3 Psychische Störungen

3.4 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|--|---|---|---|--|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| PS4 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen z. B. - Abhängigkeits-syndrom | 1. des Antriebs und des Willens 2. der Verhaltensmuster 3. der Merkfähigkeit und des Kurzzeitgedächtnisses 4. im Realitätsbewußtsein und in der Selbsteinschätzung | Einschränkung: 1. in der Selbstversorgung und Alltagsbewältigung 2. im Verhalten | <ul style="list-style-type: none"> - Selbständigkeit in der Selbstversorgung - Verbesserung des situationsgerechten Verhaltens - Verbesserung der Tagesstrukturierung - Verbesserung der Beziehungsfähigkeit - Verbesserung der Belastungsfähigkeit und der Ausdauer | A1. Psychisch-funktionelle Behandlung (in der Regel Behandlung in Gruppen) A2. Hirnleistungstraining/neuropsychologisch orientierte Behandlung Verordnung nur möglich aufgrund einer psychiatrischen Eingangsdiagnostik Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 40 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |

3 Psychische Störungen

3.5 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen

| Indikation | | | Ziel der Ergotherapie | Heilmittelverordnung im Regelfall |
|--|---|--|--|--|
| Diagnosengruppe | Funktionelle/strukturelle Schädigung | Leitsymptomatik: Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) | | A. vorrangiges Heilmittel B. optionales Heilmittel C. ergänzendes Heilmittel ----- Verordnungsmengen je Diagnose |
| PS5 Dementielle Syndrome z.B. - Morbus Alzheimer, insbesondere im Stadium der leichten Demenz (CDR 0,5 und 1,0) | 1. der Merkfähigkeit und des Kurzzeitgedächtnisses 2. der Orientierung zu Raum, Zeit und Personen 3. der psychomotorischen Funktionen | Einschränkung: 1. im Verhalten 2. in der Selbstversorgung 3. in der zwischenmenschlichen Interaktion 4. der kognitiven Fähigkeiten 5. der Beweglichkeit und Geschicklichkeit | - Erhalt und Verbesserung der Selbstversorgung - Erhalt und Verbesserung kognitiver Funktionen - Erhalt und Verbesserung der Orientierung zu Raum, Zeit und Personen | A1. Hirnleistungstraining / neuropsychologisch orientierte Behandlung A2. Psychisch-funktionelle Behandlung Verordnung nur möglich aufgrund einer psychiatrischen Eingangsdiagnostik Erst-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Folge-VO: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 10x/VO Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls: <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 40 Einheiten Frequenzempfehlung: <ul style="list-style-type: none"> • mind. 1x wöchentlich |